

## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Vilafranca del Penedès

Avís del 19 de novembre de 2018  
40/2018

### Vinya, olivera i fruiters

#### Vinya

##### Malalties de la fusta

Les ferides que es produeixen en realitzar la poda, constitueixen possibles vies d'entrada dels fongs causants de les malalties de la fusta en vinya: llampat i eutipiosi. Actualment, no existeixen productes curatius eficaços per combatre aquestes malalties. Per aquest motiu i per tal de reduir el seu impacte, es recomana aplicar les següents mesures:

- Podar aviat les vinyes més afectades
- Eliminar i destruir els braços i els ceps morts
- Fer una poda racional, minimitzant la realització de ferides grosses i rebaixos
- Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda
- Aplicar algun producte protector sobre les ferides de poda



##### Confusió sexual

Un cop acabada la campanya, cal retirar els difusors de confusió sexual per tal de no deixar residus a la vinya. Durant la poda és un bon moment per fer-ho. El vostre distribuïdor us indicarà, en cada cas, on s'han de dipositar els difusors recollits.

## Olivera

### Ull de gall

Les ferides realitzades durant la collita faciliten la penetració de fongs i bacteris. A mesura que vagi finalitzant aquesta, es recomana realitzar algun tractament fungicida a base de coure i compostos orgànics per tal de prevenir-ho. Especialment aquest any, que estem tenint una tardor molt plujosa.

## Fruiters en general

### Tractament a la caiguda de fulles

Per tal prevenir l'aparició de malalties que inicien el seu desenvolupament a partir de les ferides que queden en caure la fulla, es recomana realitzar un tractament amb productes a base de coure quan les plantacions estiguin entre el 80 i el 90% de caiguda de fulles.

A les plantacions de presseguer afectades per algun tipus de xancre, com *Fusicoccum* o *Monilia*, per aconseguir una bona eficàcia, és convenient realitzar dos tractaments: el primer entre el 50 i el 60% de la fulla caiguda, i el segon al 100% i barrejar-hi algun fungicida orgànic. En aquests darrers casos, també és important tenir en compte mesures culturals, com retirar del camp i cremar les branques afectades, podar els arbres en ple repòs vegetatiu i evitar adobats nitrogenats excessius.

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Enllaços d'interès:

[DOSAVIÑA: una eina per la correcta aplicació dels fitosanitaris en vinya](#)

[Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica Olivera i fruita seca ecològica](#)

**Informació facilitada pel contestador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)**

**Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34**

[sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat](mailto:sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat)

Si voleu donar-vos de baixa d'aquest servei, respongueu aquest correu indicant BAIXA.