



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Castelló d'Empúries

Avís del dia 28 de Maig de 2024
Avís número : 19/2024

AVÍS REALITZAT EN COL·LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE VINYA, OLIVERA I HORTA DE GIRONA

VINYA

Floració

Cal tenir present que s'inicia el període de la floració, moment de màxima sensibilitat de la planta a les malalties.

Oïdi

Durant el període de la floració és indispensable fer una aplicació, utilitzant productes líquids a principis del període o sofre en pols en plena floració.
El sofre en pols també té bona eficàcia contra els àcars en general.

Míldiu

Durant el període de la **floració** la sensibilitat de la planta a la malaltia és màxima, recomanem protegir les vinyes abans dels episodis de pluja previstos per aquesta setmana.

OLIVERA

Repilo o ull de gall

Durant el període de la floració es recomana no fer cap tractament fitosanitari.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Castelló d'Empúries

HORTA

Per a més informació sobre les plagues i malalties, podeu consultar els [avisos fitosanitaris mensuals publicats a la web de Sanitat Vegetal](#).

Fongs en general

En condicions d'altres humitats cal estar atents al possible desenvolupament d'alguns fongs en cultius com ara l'enciam, la ceba, el porro i el calçot. També el rovell en el cas del cultiu de l'all.

Es recomana fer plantacions poc denses per tal d'afavorir la ventilació i procurar un bon drenatge del terreny, com també volem recordar la importància de la rotació de cultius.

Pugons

Durant aquest mes, les colònies de pugons es consoliden i caldrà vigilar que no s'estableixin en aquells cultius que estiguin a punt de cabdellar.

Eruques

Durant aquests mesos cal estar atents als atacs de les erugues ja que en plàntules petites poden arribar a menjar-se l'ull i afectar al seu desenvolupament. Observar l'evolució de la plaga amb trampes de feromones pot ajudar a determinar la necessitat o no de tractament i el moment més adient. Vigilar els cultius i realitzar tractaments quan s'observi posta i/o presència d'erugues amb productes que respectin la fauna auxiliar.

Puçot

Aquest petit coleòpter, també anomenat saltricó, provoca picades a les fulles de les bledes i remolatxa entre d'altres, i pot arribar a acabar matant la planta quan és jove, o bé pot fer perdre el seu valor comercial.

Escarabat de la patata

Poden arribar a paralitzar el creixement de la patata. Es tracta d'una plaga molt voraç i amb unes generacions que s'encavalquen i en fan difícil el control. El període crític de defoliació de la patata per part de l'escarabat és tot just abans i després de la floració. Una sembra primerenca i el manteniment de la capa superior seca i sense treballar dificulten la penetració de les larves en el sòl, i, en conseqüència, la formació de la pupa.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Castelló d'Empúries

PARCS I JARDINS

Morrut de les palmeres i Eruga barrinadora

Durant el mes de maig s'ha de realitzar el primer tractament preventiu contra aquestes plagues, a principis de mes pel morrut i a finals de mes per l'eruga.

Si apareixen símptomes d'atac cal realitzar un tractament de xoc per evitar la seva dispersió i destruir, ràpidament, els trossos afectats per trituració en un abocador-gestor autoritzat per tractar restes de jardineria i forestals.

Servei de Sanitat Vegetal a Girona (972 45 43 10)

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
17486 Castelló d'Empúries
ssv.g.daam@gencat.cat

 **Sanitat Vegetal Girona**