



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural



ESTACIÓ D'AVISOS DEL SERVEI DE SANITAT VEGETAL INFORMADOR AUTOMÀTIC DE MÓRA D'EBRE

Avís del dia: 15 d'abril de 2024

Avís 4/2024

Cultius:

Vinya, Cirerer, Olivera, Ametller, Presseguer i Nectarina

ACTUACIONS EN PARCEL·LES ABANDONADES

La Llei 43/2002 de sanitat vegetal estableix l'obligació d'arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc per les plantacions veïnes.

El Decret 137/2014, de 7 d'octubre, en el seu article 6.1 indica que "Les plantacions de conreus llenyosos tenen consideració de conreu abandonat si en els darrers dos anys no s'hi ha practicat operacions de conreu". L'article 6.2 estableix que "és obligatòria l'arrencada i destrucció dels conreus, plantacions, collites i material vegetal que constitueixi un risc fitosanitari greu".

Demanem la col·laboració per a la identificació de les parcel·les que es puguin considerar abandonades i que contacteu amb els Serveis Territorials del DACC a les Terres de l'Ebre.

Vinya

Corc del raïm (*Lobesia botrana*). Confusió sexual

Els difusors per controlar la plaga ja han d'estar instal·lats a les dos comarques.

Cendrosa

Tan bon punt les noves brotades tinguin uns 10-15 cm de brotació o bé hi hagi de 4 a 5 fulles desplegades, es recomana iniciar la seva protecció. Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

Cirerer

Drosophila suzukii

Es recomana anar protegint tota cirera susceptible a ser picada, és a dir, a partir d'inici de maduració (color palla).

Olivera

Repilo

Cal fer el tractament si es veuen taques a les fulles i repetir-lo cada 4-5 setmanes si es continuen veient símptomes. En cas de pluges o humitats altes que afavoreixen les infeccions cal que realitzeu un tractament preventiu. Si plou més de 15-20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

Caparreta negra (*Saissetia oleae*)

Hi ha dos moments per fer el tractament contra la caparreta (primavera i tardor). En aquests moments si tenim presència d'aquesta plaga podem fer un tractament.

Ametller

Pugó verd

A partir d'ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en brots tendres.

Taca ocre

A les finques amb problemes durant la campanya anterior, recordem que és convenient de fer un tractament des de que el fruit és tendre fins a finals de maig.

Presseguer i Nectarina

Arrufat

Es recomana mantenir protegides les plantacions amb fungicides cúprics, especialment aquelles que normalment es veuen afectades o amb presència de la malaltia.

Pugó verd

Es recomana vigilar la presència de colònies en els brots i fer el tractament contra aquesta plaga.

Cendrosa - Monilia

Per tal d'evitar danys a la fruita cal mantenir protegides les varietats sensibles fins a l'enduriment de pinyol.

Informació facilitada per l'informador automàtic de Móra d'Ebre (977 40 14 66)

Plaça Democràcia, s/n. 43740 Móra d'Ebre. Telèfon 977 40 00 24 ssv.te.daam@gencat.cat <http://www.gencat.cat/daam>

Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

twitter.com/agriculturacat

facebook.com/agriculturacat