



PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT. INFORME ANUAL SOBRE EL SERVEI DE GESTIO DE FAUNA.

PERÍODE GENER A DESEMBRE DEL 2023.



INDEX

1.	CONTINGUT INFORME ANUAL	3
2.	ANÀLISIS DELS PLANES ELABORATS	4
3.	CONCLUSIONS. PLANS DE CONTROL.....	16
4.	ANÀLISI DE LA TRAMITACIÓ DE PLANS DE CONTROL: TOTAL DE CAPTURES, EVOLUCIÓ DE CAPTURES,.....	17
5.	CONCLUSIONS DELS RESULTATS DE CAPTURES	25
6.	TREBALLS DE CONTROL DE GARSÀ.....	25
7.	CAPTURES DE FAUNA SALVATGE CINEGÈTICA REALITZADES.....	26
8.	CONCLUSIONS. CAPTURES PER ESPÈCIES.....	30
9.	ALTRES TREBALLS DE GESTIÓ I CONTROL.....	30
9.1	Gestió dels dipòsits i restes de caça.....	30
9.2	Comunicació amb la pagesia i els caçadors.....	31
10.	RESULTAT DEL CENS D'AUS I DEL SEGUIMENT DE LES AFECTACIONS ALS CULTIUS	33
10.1	GARSÀ.....	34
10.2	ESTORNELL.	36
10.3	FAISÀ.	37
10.4	TUDÓ	38
10.5	COTORRETA DE PIT GRIS	39
10.6	COLOM ROQUER	40
10.7	GAVIÀ ARGENTAT.....	41
10.8	ÀNEC COLL VERD.....	42
10.9	POLLA D'AIGUA	43
10.10	SENGLARS.....	44
10.11	CONILL	45
11.	CONCLUSIONS. DENSITATS D'ESPÈCIES.	46
12.	ANÀLISI DEL COMPORTAMENT DELS SENGLARS A LA ZONA OBJECTE DEL CONTACTE I MESURES DE GESTIÓ.....	47
13.	EL CAS DEL CABIROL	50



1. CONTINGUT INFORME ANUAL

El Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el contracte de Gestió de Fauna al Parc Agrari segons expedient CPABL núm.:2023/1, inclou, al seu apartat 8.4 el requeriment, per part de l'adjudicatari, de presentar la corresponent Memòria Anual del Servei. Degut a que l'execució del contracte va començar al segon trimestre de l'any, el període que inclou aquest informe va des del mes de maig al de desembre del 2023, ambdós inclosos. Totes les dades que es recullen en aquest informe fan referència exclusivament al període esmentat.

El present informe és un avanç que es lliure a mode d'esborrany a petició d'un dels ajuntaments. A la reunió de presentació es lliurarà l'informe complet.

Segons el que es descriu al plec tècnic, els apartats que ha d'incloure son els següents.

Anàlisis dels plans elaborats

Anàlisi de la tramitació de plans de control: total de captures, evolució de captures,

Cartografia de les actuacions realitzades en format digital SHP: haurà d'incloure totes les dades dels plans de control

Captures de fauna salvatge realitzades referenciades sobre cartografia digital SHP

Resultat del cens d'aus i del seguiment de les afectacions als cultius

Anàlisi del comportament dels senglars a la zona objecte del contacte i mesures de gestió

Indicadors de seguiment i avaluació del servei

Conclusions i propostes de millora

A continuació es desenvolupen els continguts.




2. ANÀLISIS DELS PLANES ELABORATS

L'activitat agrícola conviu en un espai a on la fauna està present de forma important. Això comporta en ocasions situacions d'interacció entre ambdós que generen danys econòmics. Aquesta situació requereix d'una gestió de la fauna, de manera que s'asseguri la minimització dels danys. Sempre respectant la biodiversitat i el benestar animal.

En aquest marc, és a on es generen els diferents Plans de Control els quals son actuacions correctives per a solucionar aquestes situacions negatives.


Durant aquest període s'han activat 392 Plans de Control (*font: Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat*), uns 20 més que l'any anterior. Per municipis la distribució ha sigut la següent.





Del total de Plans de Control, el municipi que ha sol·licitat més Plans de Control ha sigut Sant Boi de Llobregat.

El rati, Plans de Control per Km2 de municipi, dona es següents dades (font superfície <https://www.idescat.cat/>,




A continuació es mostra, de forma gràfica la distribució dels diferents Plans de Control de fauna que apliquen al territori.

	MUNICIPI	ZONA
Z1	EL PRAT	Tot el municipi
Z2	SANT BOI	Tot el municipi
Z3	VILADECANS	Tot el municipi
Z4	SANTA COLOMA	Tot el municipi




Plans de Control oberts mensualment. S'inclouen els punts a on es fan els controls, amb el desplegament dels punts d'ençebament per Pla de Control. Per els casos a on s'obre tot el municipi per a control de garsa i caça menor, es mostra el punt central del terme com a referència. A mode d'exemple, aquesta representació mostra el número de fitxa associada a cada punt.





Els Plans de control oberts per al control de senglar inclouen l'encebament i aguait nocturn, així com el parament de gàbia. A continuació es mostren els principals paratges a on s'han fet actuacions d'aguait nocturn per a senglar. Inclouen les zones d'encebament per atraure als porcs.



Com a mètode auxiliar, el Consorci proporciona als caçadors torretes d'aguait i espera. Son plataformes elevades que permeten al caçador de disposar d'una posició



avantatjosa per quan arriba el senglar a un lloc d'encebament. També son un element de seguretat. Actualment n'hi ha tres i son els caçadors els que hi gestionen la ubicació respectant sempre les ubicacions autoritzacions per als encebaments.






Les gàbies de captura de senglar s'ha anat movent pel territori, en funció de necessitats. En total hi ha 3 gàbies de captura. A continuació es mostren algunes de les seves ubicacions, al llarg de l'any.





Distribució Plans de control oberts per de caça menor any 2023. Es considera caça menor la que no inclou al senglar. A continuació es mostren les principals ubicacions i el mètode emprat en cadascuna d'elles.






Al següent plànol es mostra la mateixa informació sobre Plans de Gestió de caça menor, però amb el número de fitxa associat, per exemple al mes de desembre.






Controls realitzats sobre Ànec col verd i polla d'aigua. Al següent plànol s'inclou informació sobre els punts de control d'aquestes dos aus.






Distribució de les gàbies de captura de garsa al territori. El següent plànol mostra la distribució de les gàbies de control de garsa, al territori, al llarg de l'any. El número correspon a la identificació de la gàbia.






Respecte als mètodes de control dissuasiu s'inclouen els vols de falconeria i la col·locació d'eolos.

En total durant l'any 23 s'han realitzat més de 200 vols de falconeria (218) distribuïts en diverses zones. A continuació es mostren les principals zones i els cultius protegits.





Les distribucions dels eolos ha sigut la següent. Es mostra les agrupacions en les col·locacions fetes durant el 2023 i els principals cultius protegits (font SOMA).





3. CONCLUSIONS. PLANS DE CONTROL.

En total s'han sol·licitat poc més de 390 Plans de Control (392). El municipi que més Plans ha sol·licitat ha sigut Sant Boi, mentre que el que menys, ha sigut Santa Coloma.

NUM PLANS DE CONTROL PER MUNICIPI	
VILADECANS	108
EL PRAT	106
SANT BOI	120
SANTA COLOMA	58
Σ	392

Tot i així si s'observa el rati per superfície municipal, es veu que els resultats varien.


	SUPERFICIE	PLANS	PLANS/Km2
VILADECANS	20,4	108	5,3
EL PRAT	31,41	106	3,4
SANT BOI	21,47	120	5,6
SANTA COLOMA	7,49	58	7,7

D'aquesta manera, Santa Coloma és el municipi que més Plans ha sol·licitat, respecte a la seva superfície. Un factor que podria explicar això podria ser que el fet de que una part del seu terme inclogui massa forestal això faciliti la presència de més fauna.




4. ANÀLISI DE LA TRAMITACIÓ DE PLANS DE CONTROL: TOTAL DE CAPTURES, EVOLUCIÓ DE CAPTURES,

Del total de Plans de Control sol·licitats durant el període, els resultats per espècie son els següents.




Per metodologia de control, els resultats son els següents






Respecte a les captures totals per espècie, s'han obtingut els següents resultats.







L'evolució de les captures de les diferents espècies, des dels anys 2017 fins l'any 2023, ha sigut la següent (*dades extretes dels resultats Plans de Control aportats pels diferents executors dels Plans: colles de caçadors, SOMA, ...*).






Per espècies, les evolucions han sigut les següents,








**EVOLUCIÓ CAPTURES DE COTORRA ARGENTINA.
GENER DESEMBRE 2023. FONT CPABLL.**




**EVOLUCIÓ CAPTURES DE CONILL. GENER
DESEMBRE 2023. FONT CPABLL.**






EVOLUCIÓ CAPTURES SENGLAR. GENER DESEMBRE 2023. FONT CPABLL.




EVOLUCIÓ CAPTURES COLOM. GENER DESEMBRE 2023. FONT CPABLL.






EVOLUCIÓ CAPTURES GAVINA. GENER DESEMBRE 2023. FONT CPABLL.




EVOLUCIO CAPTURES ÀNEC-POLLA ANYS 2017-2023






EVOLUCIÓ CAPTURES TÓRTORA TURCA. GENER DESEMBRE 2023. FONT CPABLL.



CAPTURES COMPARATIVA 2022-23. blau 2023-vermell 2022. font CPABLL





5. CONCLUSIONS DELS RESULTATS DE CAPTURES

En general i a excepció dels tudons i coloms, hi ha hagut menys captures que l'any 22.

La tendència general és a una disminució de les captures, tot i que hi ha espècies que encara mantenen una tendència ascendent, cas dels coloms, tudons i senglars.

Tot plegat en un marc de creixement de nombre de peticions de Plans de Control, respecte al 22 (+4,⁵ %)

6. TREBALLS DE CONTROL DE GARSA

El programa de gestió de fauna inclou el desplegament de control de la població de garses mitjançant gàbia. Aquestes gàbies son de tipus hexagonal, amb quatre receptacles de captura i un habitacle central a on es diposita una garsa viva tipus esquer.

Durant aquest període, el nombre màxim de gàbies disposades ha sigut de 25, mentre que el mínim ha sigut de 15.


La distribució de les gàbies ha vingut determinada per quatre vies,

Indicacions del tècnic de camp, després d'observar-ne necessitat,

Peticció directa del pagès,

Peticció després d'oferiment,

Peticció del pagès a través d'un tercer.



7. CAPTURES DE FAUNA SALVATGE CINEGÈTICA REALITZADES


Els resultats de les captures de fauna salvatge, per municipis ha sigut la següent.


	GARSA	ESTORNELL	FAISÀ	TUDÓ	COTORRA	CONILL	SENGLAR	COLOM	GAVINA	ÀNEC	POLLA	TÓRTORA
VILADECANS	177	105	19	2072	23	11	33	710	2	24	9	0
EL PRAT	225	26	26	2350	116	0	17	19	0	0	0	0
SANT BOI	200	104	18	6219	256	258	54	644	4	0	0	0
SANTA COLOMA	151	81	1	1079	62	2	86	143	0	0	0	0
Σ	753	316	64	11720	457	271	190	1516	6	24	9	0

Captures d'espècies per municipis any 2023. Font. CPABLL.



Visualment, això es distribueix de la següent forma.





El cas de la garsa ha sigut especial en tant que la seva captura porta associat el desplegament d'un seguit de gàbies esquer, així com la gestió de recams i altres sistemes accessoris.



Si es tradueixen aquestes dades en valors de massa, assumint un coeficient de valor mig com el que es mostra a la següent taula,

	GARSA	ESTORNELL	FAISÀ	TUDÓ	COTORRA	CONILL	SENGLAR	COLOM	GAVINA	ANEC	POLLA	TORTORA
Massa (Kg) mitja/peça	0,21	0,075	0,95	0,4	0,09	1,5	65	0,25	0,9	1	0,3	0,15

...i s'aplica als valors de les captures obtingudes per a cada espècie, s'obtenen els Kg de biomassa retirats per a cada un dels grups, tal i com es pot veure a la següent taula.


	GARSA	ESTORNELL	FAISÀ	TUDÓ	COTORRA	CONILL	SENGLAR	COLOM	GAVINA	ANEC	POLLA	TORTORA
2023	753	316	64	11.720	457	271	190	1.516	6	24	9	0
Massa/peça	0,21	0,075	0,95	0,4	0,09	1,5	65	0,25	0,9	1	0,3	0,15
Total Kg	158,13	23,7	60,8	4688	41,13	406,5	12.350	379	5,4	24	2,7	0

Si es fa la comparativa amb l'any passat els resultats son els següents.

Número peces	GARSA	ESTORNELL	FAISÀ	TUDÓ	COTORRA	CONILL	SENGLAR	COLOM	GAVINA	ANEC	POLLA	TORTORA
2023	753	316	64	11.720	457	271	190	1.516	6	24	9	0
2022	1849	1147	153	10114	1097	448	309	1660	295	42	19	1851

Si es fa el percentatge que aquesta biomassa representa respecte al total de la que s'extreu, s'obtenen els següents resultats percentuals, per espècie.

	GARSA	ESTORNELL	FAISÀ	TUDÓ	COTORRA	CONILL	SENGLAR	COLOM	GAVINA	ANEC	POLLA	TORTORA
% por espècie	1,18%	0,35%	0,61%	17,73%	0,39%	2,96%	72,51%	1,58%	1,19%	0,24%	0,02%	1,24%



8. CONCLUSIONS. CAPTURES PER ESPÈCIES.

Si es compara amb el 22, l'any 23 representa un descens en el nombre d'individus capturats de totes les espècies a excepció dels coloms i tudons.

Això també és aplicable al cas del senglar, tot i que la tendència dels últims cinc anys encara mostra una tendència a l'alça.

L'espècie que més contribueix a treure biomassa del sistema continua sent el senglar, amb quasi un 70%, mentre que aportacions d'altres espècies son minoritàries.

9. ALTRES TREBALLS DE GESTIÓ I CONTROL

9.1 Gestió dels dipòsits i restes de caça

Les restes de caça es dipositen en contenidors habilitats per a la seva recollida i gestió. Fins els mes de novembre hi havia dos contenidors ubicats prop les dependències de la Policia Local de Sant Boi. Al mes de novembre i a l'espera d'una ubicació definitiva, s'han traslladat a la part del darrera de Can Comas.



Durant el 23 s'han fet les gestions necessàries perquè les diferents colles dipositessin els senglars embolcallats i tanquessin els contenidors amb els candaus facilitats.



Tanmateix s'ha coordinat amb l'empresa de recollida per a la seva evacuació, dins de les 24 hores següents (quan això ha estat possible per no coincidir amb cap de setmana). S'ha intentat fer la gestió per a que les recollides es fessin a primera hora, però ni l'actual empresa ni cap amb les que s'ha contactat ho han pogut oferir.

Per últim i per assegurar el bon estat higiènic i sanitari dels contenidors es van fer neteges setmanals (2-3) a través d'una empresa especialitzada.

En total, durant el 23 s'han fet 75 recollides de restes animals, i un total de 143 neteges programades, més cinc d'extraordinàries.



9.2 Comunicació amb la pagesia i els caçadors

Periòdicament es manté contacte amb la pagesia per tal de tenir en compte possibles incidències amb fauna, i per copsar propostes de millora al respecte de la seva gestió. Per això es fan trucades a l'atzar entre els diferents pagesos, preguntant sobre l'estat



del camp en relació als problemes amb fauna i la possibilitat d'intervenir-hi de forma preventiva. També, durant les visites de camp dels tècnics s'aprofita per a parlar amb els pagesos sobre les seves necessitats.

Les conclusions d'aquestes feines de seguiment directe amb els pagesos es poden resumir en,

El pagès és un professional que coneix el camp i la interacció amb la fauna.

Quan planteja un problema necessita solucions immediates.

Per evitar problemes de rebuig cal dosificar els oferiments de serveis.

Amb els caçadors es mantenen converses a través dels grups de wassaps. Amb determinades colles es mantenen reunions mensuals i trucades setmanals de seguiment. En general és un col·lectiu que sol aportar i col·laborar, tot i que hi ha excepcions.



10. RESULTAT DEL CENS D'AUS I DEL SEGUIMENT DE LES AFECTACIONS ALS CULTIUS


Trimestralment s'han anat actualitzant les dades sobre el comptatge d'individus. Els censos consisteixen en la delimitació de parcel·les de treball properes o dins de les zones a on s'estan fent els controls de fauna, de manera que es fa un comptatge aleatori d'individus de l'espècie objectiu del control. Durant el 23, i tal i com es va descriure per al 22, aquests comptatges es fan de manera anterior a la disposició dels mètodes de control i es repeteixen posteriorment un cop fets els controls (per ampliar metodologia, veure informes trimestrals presentats).

A continuació es mostren els resultats obtinguts per a cada espècie i municipi, abans de la aplicació del mètode de control (pre) i després de l'aplicació del control (post). Aquestes dades estan actualitzades a 21 de desembre de 2023.

El mètode càlcul anual ha sigut la ponderació dels resultats del comptatges realitzats de forma mensual.




10.1 GARSÀ



Les garses, en general, es troben en zones de conreu, sense massa vegetació cobertora i amb arbres disseminats.

Durant l'any 23 es continuen observant desplaçaments de grups de garsa, entren a la zona del Parc (86 observacions de gener a novembre del 23).



Mapat simplificat de les principals trajectòries dels grups de garsa observats durant el període de treball de camp, que entren a l'àmbit del Parc.

Durant aquest any s'ha reforçat la idea de reompliment geogràfic, per part d'individus provinents de zones limítrofs.




10.2 ESTORNELL.



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Densitat 22	36, ⁰²	76, ⁰⁷	70, ¹⁸	45, ⁷⁴
Densitat 23	30, ⁰⁴	82, ⁰¹	57, ²¹	47, ³⁸




10.3 FAISÀ.



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Densitat 22	3, ⁹²	7, ³⁵	0, ⁹⁷	1, ¹⁶
Densitat 23	0, ⁹⁹	5, ¹⁸	1, ⁵⁵	1, ²¹




10.4 TUDÓ



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Densitat 22	66, ⁶⁷	72, ⁰⁶	25, ²⁴	32, ³⁷
Densitat 23	79, ⁵²	75, ²⁸	26, ⁷⁶	16, ⁵⁹




10.5 COTORRETA DE PIT GRIS



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Densitat 22	15, ⁰³	26, ⁴⁷	5, ⁸³	9, ⁸³
Densitat 23	21, ¹⁷	31, ¹²	4, ⁴¹	10, ⁷⁷




10.6 COLOM ROQUER



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Densitat 22	6, ⁵⁴	30, ⁸⁸	11, ⁶⁵	12, ¹⁴
Densitat 23	7, ⁵³	25, ¹²	15, ⁰⁰	10, ²¹




10.7 GAVIÀ ARGENTAT



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Densitat 22	16, ³⁴	22, ⁰⁶	1, ⁹⁴	12, ¹⁴
Densitat 23	11, ²⁰	20, ¹²	8, ¹²	9, ³²




10.8 ÀNEC COLL VERD.



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Densitat 22	3, ⁹²	8, ⁸²	5, ⁸³	4, ⁶²
Densitat 23	0, ⁴⁹	4, ⁵⁹	3, ²⁵	4, ⁰⁰



10.9 POLLA D'AIGUA



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Densitat 22	2, ⁶¹	2, ⁹⁴	0, ⁹⁷	2, ⁸⁹
Densitat 23	1, ⁵⁸	1, ¹³	0, ⁹⁵	1, ¹⁰



10.10 SENGLARS



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Rastres senglar 22	4	7	6	4
Rastres senglar 23	5	9	10	7



10.11 CONILL



	Vermell	Blau	Rosa	Verd
	El Prat	Sant Boi	Sta. Coloma	Viladecans
Rastres conill 22	2	2	2	1
Rastres conill 23	8	11	6	5



11. CONCLUSIONS. DENSITATS D'ESPÈCIES.

Les conclusions que es poden derivar de les observacions realitzades son, com a resum.

La garsa manté les seves densitats, i, en relació a les observacions d'abans i de després del trampeig no s'observen grans diferències de densitats. Cal dir que no es fa el comptatge de forma immediata a la retirada o canvi del sistema de captura.

L'estornell baixa a Santa Coloma i El Prat, mentre que es manté, lleugerament a l'alça a Viladecans i Sant Boi. Possiblement la manca de fred intens hagi dissuadit de la formació de grans estols, els quals feien augmentar la seva presència.

Les observacions de faisà disminueixen a El Prat i Sant Boi, mentre que a Santa coloma i Viladecans, augmenten. No es pot afirmar que sigui significatiu, donat que, com el cas de la polla d'aigua, son animals que costen de veure.

El tudó augmenta en tots els municipis a excepció de Viladecans, mentre que la cotorreta augmenta en tots menys en Santa Coloma. En ambdós casos es creu que son xifres poc significatives.

El colom roquer augmenta a El Prat i Santa Coloma i disminueix a Sant Boi i Viladecans. El gavià disminueix en general i només augmenta a Santa Coloma. Per altres observacions realitzades s'ha vist que els gavians es deixen veure terra endins principalment en dies de mala maror. Aquest any, amb pocs dies de temporal, no han tingut la necessitat de fer aquestes incursions. Això podria explicar, al menys en part la disminució en les observacions. Per últim, tant l'ànec com la polla d'aigua, disminueixen en observacions.

Els mamífers, tant el senglar com el conill, augmenten. En el cas del conill, i durant la segona meitat de l'any s'ha patit una explosió demogràfica que ha produït danys importants.




12. ANÀLISI DEL COMPORTAMENT DELS SENGLARS A LA ZONA OBJECTE DEL CONTACTE I MESURES DE GESTIÓ

Si bé les consultes realitzades al portal de seguiment del porc senglar a Catalunya indiquen que ha disminuït la densitat de porcs a la zona d'estudi, la quantificació realitzada mitjançant la observació directa de rastres, indiquen un lleuger augment.

Així doncs i segons el portal, semblaria que baixa la densitat de la zona de desembocadura del Llobregat, passant d'una forquilla estimada de entre 3-6 a 12-15 senglars a una forquilla de 6-9 a 9-12. Encara que, segons com es llegeixin els resultats, poden haver pujades.


2022

2023




Font: <https://senglar.cat/programa-de-seguiment/>

Respecte a la seva evolució global a tot Catalunya, sembla que recula el creixement respecte a l'any passat, però caldrà fer un seguiment.



Font: <https://senglar.cat/programa-de-seguiment/>

Tal com s'ha exposat, durant el període que inclou aquest informe, es van capturar 190 individus, quasi 120 porcs menys que l'any anterior.



Font: dades Plans de Control.

No s'ha pogut comprovar la connexió dels senglars a la zona del Parc, ni el seu grau d'aïllament respecte a altres poblacions o els seus moviments dia-nit-dia, però se sospita que els porcs no fan grans moviments dia-nit. Aquesta possibilitat ha sigut comentada amb les diferents colles de caçadors que vindrien a recolzar la idea de que el senglar ja



no retorna a la forest durant el dia a descansar, sinó que es queda a prop de les zones d'horta durant les hores diürnes.



Parell d'imatges nocturnes de senglars alimentant-se a punt on es farà un aguait nocturn. Agost 2023.



Al respecte, seria interessant implantar la proposta de marcatge i seguiment d'individus. Això, a més permetria un treball més dirigit en les accions de prevenció i control de danys.

Tampoc s'han provat mesures de protecció, tals com tanques especials o de malla o repel·lents olfactius.



13. EL CAS DEL CABIROL

Tot i no ser objecte del present programa de control, es creu interessant incloure una petita referència a la presència cada cop més important de cabirols (*Capreolus capreolus*). Aquest cèrvid està establint posicions a la zona de Santa Coloma de Cervelló i, semblaria que, poc a poc, es va deixant veure a parts més baixes, a on la zona de forest es mescla amb la d'horta. Donat el seu potencial d'afectació a conreus de fruiters i vinyes principalment, seria interessant de començar a fer-hi un seguiment.



Captura amb visor nocturn de cabirol a camps de conreu de Santa Coloma de Cervelló

Cabirol vist amb visor nocturn. Santa Coloma de Cervelló. Noteu la proximitat a les zones habitades del fons.

