



CULTIUS LLENYOSOS. SETEMBRE DE 2026

FRUITA DOLÇA

PLAGUES I MALALTIES COMUNES A DIVERSOS FRUITERS

Aranya roja (*Panonychus ulmi*)

Seguiment de poblacions

Es recomana fer controls visuals per avaluar les poblacions de larves d'aranya roja i d'àcars fitoseids (depredadors de l'aranya).

Control biològic

A partir de finals d'agost, les poblacions d'aquest àcar disminueixen. Si es troben fitoseids, és recomanable no tractar, ja que és força probable fer el control biològic de la plaga.

Tractament fitosanitari

Si hi ha més del 50% de fulles ocupades per l'aranya i no hi ha fitoseids, caldrà tractar amb algun producte autoritzat segons el cultiu.

Consulteu en el registre oficial els cultius autoritzats i les condicions d'ús de cada matèria activa.

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Seguiment de poblacions

A mesura que les varietats entrin en fase de verolada, cal que estigueu atents a l'evolució del vol, a l'aparició de danys en fruit i als avisos de les diferents zones fruíteres.

Es recomana seguir l'evolució del vol mitjançant trampes amb esquers atraients.

Mètodes alternatius

Els mètodes alternatius de captura massiva i el d'atracció i mort presenten una bona eficàcia per mantenir la plaga sota control. És fonamental acompanyar l'ús d'aquests mètodes amb la instal·lació de trampes de seguiment i/o la realització de recomptes de fruits.

Tractament fitosanitari

Pot resultar necessària la intervenció amb algun producte fitosanitari, sobretot a mesura que ens apropem a la recol·lecció de les diferents varietats.

Consulteu en el registre oficial els cultius autoritzats i les condicions d'ús de cada matèria activa.

Poll de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*)

Al setembre, naixeran les larves de tercera generació.

Tractament fitosanitari

A fi que la fauna auxiliar pugui desenvolupar-se, es recomana no tractar en aquest moment, tret d'aquelles finques que presentin greus atacs que afectin la fruita.

POMERA I PERERA

Càpues (*Pandemis heparana*, *Adoxophyes orana*, *Cacoecimorpha pronubana*)

Seguiment de poblacions

Recomanem instal·lar trampes de feromona sexual. Només és recomanable tractar si es capturen més de 20 adults d'*Adoxophyes* i/o *Pandemis* o 40 adults de *Cacoecimorpha* per trampa i setmana.

Tractament fitosanitari

En cas de superar el llindar, cal escollir el producte adequat segons l'estadi majoritari en què es trobi la plaga.

Consulteu en el registre oficial els cultius autoritzats i les condicions d'ús de cada matèria activa.

Carpocapsa (*Cydia pomonella*)

Durant el mes de setembre molt probablement finalitzarà el vol de la tercera generació de carpocapsa. El llindar de tolerància s'estableix en dos adults capturats per trampa i setmana.

Tractament fitosanitari

En cas de superar el llindar, tracteu amb algun dels productes fitosanitaris autoritzats.

Es recomana alternar les matèries actives per evitar resistències, i no repetir una matèria activa utilitzada en la primera generació en les generacions successives. En presència de mosca de la fruita, apliqueu insecticides actius contra ambdues plagues.

Consulteu en el registre oficial els cultius autoritzats i les condicions d'ús de cada matèria activa.

Cemiosoma (*Leucoptera malifoliella*)

Tractament fitosanitari

Només recomanem tractar, abans del naixement de les larves de la tercera generació, les plantacions on s'hagin observat més de dues mines no parasitades per arbre durant la segona generació.

Barrinadors de fusta (*Zeuzera pyrina*, *Synanthedon myopaeformis*, *Cossus cossus*)

Al mes de setembre, les poblacions d'adults són baixes. Només s'aconsella tractar les plantacions en formació que presentin nous brots atacats per *Zeuzera*.

Tractament fitosanitari

A les plantacions en formació, caldrà iniciar els tractaments a mesura que s'observin els primers símptomes d'atac: fulles seques a l'extrem dels brots (*Zeuzera*) i galeries al tronc (*Cossus*).

PERERA

Psil·la (*Cacopsylla pyri*)

Seguiment de les poblacions

Es recomana fer el seguiment de les poblacions mitjançant un recompte de brots per establir el percentatge d'ocupació i l'estat de desenvolupament de la plaga en cada moment.

Mesures culturals

Resulta molt convenient per afavorir el control de psil·la respectar al màxim els enemics auxiliars a l'hora de fer qualsevol intervenció.

A partir d'un determinat moment, les nimfes es concentren en l'extrem dels brots en creixement. En aquest cas, i segons la problemàtica, pot ser convenient realitzar una esporga en verd per eliminar aquests brots.

Tractament fitosanitari

En absència de fauna auxiliar, tracteu quan observeu més del 10% dels brots en creixement ocupats per larves.

Quan comenceu a observar melassa, recomanem afegir als tractaments insecticides un producte dissolvent.

Stemphylium vesicarium

Tractament fitosanitari

Cal mantenir protegides les plantacions amb incidència de la malaltia fins a la collita. Les finques restants només cal protegir-les durant els períodes plujosos o d'humitats elevades. És recomanable seguir els perills d'infecció a través dels models predictius disponibles a Ruralcat.

FRUITERS DE PINYOL

Anàrsia (*Anarsia lineatella*) i grafolita (*Cydia molesta*)

Durant el mes de setembre, volen la tercera i última generació d'anàrsia, i la cinquena i darrera generació de grafolita.

Mètodes alternatius

En general, es recomana fer el seguiment de les poblacions d'aquestes plagues mitjançant trampa de feromona sexual. En el cas concret de finques amb el mètode de confusió sexual, resulta convenient fer recomptes de fruits per determinar si cal complementar aquest mètode amb algun tipus de tractament.

Tractament fitosanitari

Apliqueu tractament quan se superin les 15 captures per trampa i setmana en cas de grafolita, o 7 en cas d'anàrsia, i/o quan es detectin danys a la plantació.

Cendrosa (*Sphaeroteca pannosa*)

Continua el risc d'atac sobre els arbres que mantinguin brots en creixement actiu.

Tractament fitosanitari

En finques en producció, cal vigilar les varietats sensibles i tractar-les a l'aparició dels primers símptomes.

En plantacions en formació, és recomanable tractar preventivament perquè no afecti el creixement dels arbres.

Aranya groga (*Tetranychus urticae*)

Durant el mes de setembre, disminueixen notablement les poblacions d'aquest àcar.

Mesures culturals

Respecteu al màxim la fauna auxiliar, indispensable perquè s'estableixi el control biològic. Si hi ha *Stethorus*, és probable que s'estableixi el control biològic d'aquesta plaga.

Tractament fitosanitari

Recomanem vigilar les plantacions i tractar quan s'observin més del 60% de fulles ocupades.

FRUITA SECA

NOGUERA

Carpocapsa (*Cydia pomonella*)

Durant aquest mes, continueu fent el seguiment de la plaga i manteniu el cultiu protegit si se supera el llindar de tractament de dos adults per trampa i setmana.

Erugueta (*Ectomyelois ceratoniae*)

En aquelles finques on s'aplica la confusió sexual contra carpocapsa (*C. pomonella*) i no es fan intervencions químiques en segona i tercera generació, es recomana fer el seguiment de la corba de vol de l'erugueta (*E. ceratoniae*) durant els mesos d'agost i setembre mitjançant trames de monitoratge. Si les captures són elevades, cal fer recomptes en fruit per valorar si es produeixen danys i cal intervenir-hi.

AMETLLER

Tigre (*Monosteira unicostata*)

Durant l'estiu, coincidint amb la tercera generació d'aquest hemípter, és quan les poblacions són més nombroses i es produeixen els atacs més forts. Cal estar atents i continuar vigilant les plantacions.

Capgròs (*Capnodis tenebrionis*)

A finals d'estiu, apareix la nova generació d'adults procedents de les larves de la generació anterior. Vigileu les plantacions, sobretot si són de secà. Si n'observeu molta població, podeu aplicar un tractament químic adreçat a reduir-ne el nivell d'adults.

Vespa de l'ametller (*Eurytoma amygdali*)

A les zones amb presència de la plaga, cal estar alerta a no dispersar-la durant la recol·lecció. Recordeu que les ametlles afectades es diferencien de les bones perquè tenen aspecte de cascull i en obrir-les trobem la larva a l'interior del gra de l'ametlla. La larva serà dins de l'ametlla fins a la primavera, que és quan es produirà la sortida dels adults.

Per lluitar contra aquesta plaga és molt important actuar de manera conjunta, i eliminar i cremar els cascalls durant la tardor i l'hivern.

En el cas de detectar-la a noves zones, cal que ens ho comuniquem.

Podeu trobar-ne més informació al full informatiu al web del DARPA:

[La vespa de l'ametller.](#)

CÍTRICS

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

A partir de l'inici del canvi de color, els fruits són susceptibles a l'atac de *Ceratits capitata*. Les poblacions de la plaga durant aquest mes acostumen a ser força elevades.

Mesures culturals

Cal protegir o eliminar els fruiters hostes aïllats, especialment les figueres, per evitar que esdevinguin focus de multiplicació de la mosca. Es recomana recollir o destruir els fruits

caiguts a terra, i eliminar la fruita no recol·lectada de les plantacions i els arbres disseminats.

Control biològic

En el marc de l'ajut a sistemes alternatius a la lluita química contra la mosca de la fruita en cítrics, s'ha d'instal·lar en camp la captura massiva o l'atracció i mort abans que apareguin les primeres poblacions de la plaga. L'objectiu d'aquestes tècniques es rebaixar el nivell de les poblacions d'adults. Un dels requisits per acollir-se a aquest ajut és ser soci d'una ADV.

Tractament fitosanitari

Cal estar atent al moment de maduració de les diferents varietats i protegir la fruita a l'inici del canvi de color dels fruits. Si s'apliquen tractaments químics, s'han d'alternar les matèries actives i tenir-ne en compte el termini de seguretat.

Aranya roja (*Tetranychus urticae*) i àcar roig (*Panonychus citri*)

Des del juliol fins a l'octubre, s'han d'observar quatre fulles madures de l'última brotada i/o quatre fruits per arbre, i determinar la presència de formes mòbils de *T. urticae*, de *P. citri* i de fitoseïds amb periodicitat setmanal o quinzenal en uns 20 arbres per hectàrea.

Mesures culturals

La sembra de festuca entre línies augmenta el nivell de fitoseïds, que disminueixen la presència d'aquests àcars en els arbres. Si es deixa espigar, el pol·len és utilitzat pels fitoseïds com a aliment.

Control biològic

S'observen amb freqüència àcars fitoseïds i coccinèl·lids. Tot i que no exerceixen un control eficaç, si s'apliquen tractaments químics que els afecten, poden incrementar les poblacions d'aranya.

Tractament fitosanitari

Per a l'aranya roja, es recomana el tractament quan hi hagi més d'un 7% de fulles amb colònies amb formes mòbils o presència de dany en fruit. L'àcar roig es tractarà quan s'observin més d'un 80% de fulles ocupades; no s'ha de tractar si hi ha més d'un 30% de fulles amb presència de fitoseïds.

En tots dos casos, es recomana tractar només els focus. Per tenir una bona eficàcia en els tractaments, cal mullar correctament les parts més elevades dels arbres. És molt important l'alternança entre matèries actives emprades, ja que, altrament, es poden desenvolupar resistències.

Poll roig de Califòrnia (*Aonidiella aurantii*)

La tercera generació de poll roig es desenvolupa sobre els fruits. El període màxim de larves de primers estadis (més sensibles als productes químics) de la tercera generació es produeix entre finals de setembre i principis d'octubre. Aquest és el moment idoni per realitzar les aplicacions químiques, si calen.

Mesures culturals

Una poda adequada assegura la ventilació de les zones interiors, dificulta la proliferació de la plaga, i facilita l'eficàcia dels tractaments químics que s'apliquin.

Tractament fitosanitari

Es recomana en aquelles parcel·les on es detecti més d'un 2% de fruits amb presència d'escuts. Si s'han aplicat tractaments contra les altres generacions, convé alternar les matèries actives per evitar l'efecte acumulatiu dels residus. És important tenir en compte el termini de seguretat dels productes fitosanitaris i la possibilitat de detecció de residus en postcollita.

Mosca blanca (*Dialeurodes citri*, *Paraleyrodes minei*, *Aleurothrixus floccosus*)

Dialeurodes citri presenta un cicle biològic amb tres generacions molt marcades. Els dos primers estadis larvaris són més sensibles als tractaments fitosanitaris. Entre finals de setembre i començaments d'octubre acostuma a produir-se el màxim de larves de la tercera generació.

Mesures culturals

És recomanable fer podes per airejar les zones interiors dels arbres. Cal fer un adobament equilibrat per evitar un excés de vigor i eliminar els brots vegetatius excessius que actuen com a focus de la plaga.

Control biològic

Els enemics naturals existents no controlen *Dialeurodes citri* ni *Paraleyrodes minei*. *Cales noacki* exerceix un bon control sobre *Aleurothrixus floccosus*. Amb nivells de parasitisme del 40-60%, la plaga es pot controlar.

Tractament fitosanitari

S'ha d'aplicar quan predominen les larves joves. Cal tenir en compte que les larves són al revers de les fulles; per tant, cal mullar bé aquesta zona utilitzant la pressió i el volum de caldo adequats. S'evitaran insecticides nocius per a *Cales noacki*.

En tractar la tercera generació, cal tenir en compte que estem controlant una nova generació de mosca blanca, però no estem eliminant la negreta que ja tinguem de les generacions anteriors; per tant, no es recomana aquest tractament en les varietats que s'hagin de collir aviat.

Si durant la campanya ja s'han aplicat tractaments contra aquesta plaga, convé alternar les matèries actives per evitar l'efecte acumulatiu dels residus. Cal respectar el termini de seguretat dels productes fitosanitaris i considerar la possibilitat de detecció de residus en postcollita.

Trips de l'orquídia (*Chaetanaphothrips orchidii*)

Es desenvolupen sobre els fruits en les zones de contacte entre dos fruits i entre fruits i fulles. Els danys consisteixen en taques fosques de forma circular en la zona de contacte entre fruits, o en taques irregulars en altres parts que van enfosquint-se.

Tractament fitosanitari

S'aconsella observar 100 fruits en contacte de la part inferior de l'arbre des del mes de juliol i aplicar tractament si hi ha més d'un 10% de fruits amb presència de trips, o si s'observa algun fruit amb danys i hi ha trips.

Cotonet de Sud-àfrica (*Delottococcus aberiae*)

Aquest cotonet ocasiona deformacions importants als fruits durant l'inici del seu desenvolupament, que en comporten la depreciació comercial. Si teniu qualsevol sospita de parcel·la afectada, cal que contacteu amb Sanitat Vegetal. Convé detectar-ne aviat la presència observant amb especial atenció els arbres dels costats dels camins o els pròxims a les zones d'apilament de caixes de recol·lecció.

Mesures culturals

Cal evitar la difusió de l'insecte de les parcel·les atacades a altres camps. Les tasques de cultiu s'hauran d'organitzar de manera que, després d'entrar a una parcel·la amb presència de plaga, no s'accedeixi a una altra sense presència de plaga sense haver aplicat les mesures d'higiene corresponents a la maquinària, els vehicles de transport i la roba dels treballadors. S'ha de tenir en compte que un dels moments crítics per a la difusió de l'insecte és la recol·lecció.

Control biològic

El Departament d'Agricultura, juntament amb l'IRTA, continua els alliberaments inoculadors del parasitoide *Anagyrus aberiae*, originari de Sud-àfrica, amb l'objectiu que s'aclimati a la nostra zona i ajudi a controlar la plaga.

Durant el mes de juliol, el Departament ha proporcionat individus del depredador *Cryptolaemus montrouzieri* per fer alliberaments, amb l'objectiu de rebaixar les poblacions de la plaga.

Tractament fitosanitari

Un cop els fruits superen els 3-4 cm de diàmetre, ja no són susceptibles de ser deformats per la plaga, i, per tant, finalitza el moment recomanat per fer les aplicacions químiques en contra.

Aigualit dels fruits (*Phytophthora* sp.)

Si es donen condicions favorables, pluges i temperatures suaus, es pot desenvolupar el fong *Phytophthora*, causant de l'aigualiment dels fruits.

Mesures culturals

Cal evitar l'entollament de les parcel·les. Es recomana allunyar els fruits del sòl, bé podant les parts baixes dels arbres, bé aixecant les branques. És important mantenir la coberta vegetal durant la tardor per evitar que les esquitxades de pluja arribin als fruits.

Tractament fitosanitari

Es recomanen els tractaments preventius per protegir les parts inferiors de l'arbre en cas de pluges o aiguats continuats. Si no s'ha pogut aplicar el tractament preventiu, s'aconsella fer una aplicació amb un fungicida sistèmic dins les 48 hores posteriors a la pluja.

Scirtothrips aurantii

En els darrers mesos s'ha confirmat, pel Laboratori Nacional de Referència, la detecció en trampa groga d'individus d'*Scirtothrips aurantii* a Catalunya en tres municipis de les Terres de l'Ebre: Alcanar, Santa Bàrbara i Tortosa. Aquesta plaga està considerada plaga de quarantena per la Unió Europea.

Des de la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a les Terres de l'Ebre s'estan realitzant mostres al voltant de les finques detectades mitjançant trampes grogues per capturar adults, colpeig i també amb observació visual de símptomes en fulla.

L'adult és de color groc i és més petit (0,6-0,9 mm) que altres trips freqüents en cítrics com són *Pezothrips kellyanus* (Pezothrips) i *Chaetanaphothrips orchidii* (Thrips de la orquídea). És una espècie molt polífaga, entre els principals hostes estan els cítrics, mango, alvocat, vinya, magraner i cotó. A Andalusia també s'ha trobat en caqui, fresa, gerd, mora i nabius. S'alimenten dels teixits en creixement com brots, fulles i fruits en formació. Els símptomes i danys són cicatrius allargades paral·leles al nervi central de la fulla, fulles en forma de punta de fletxa, atacs severos en noves brotades i cicatrius en fruit.

Caldrà estar atents, observar amb deteniment possibles símptomes en brots, fulles o fruits i, en cas de sospita, avisar a la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a les Terres de l'Ebre.

Tractament fitosanitari: s'ha autoritzat excepcionalment la comercialització i l'ús dels productes fitosanitaris formulats a base de **Spinosad 48% [SC]** P/V per al control de *Scirtothrips* sp i *Chaetanaphothrips orchidii* des de l'1 d'abril fins al 29 de juliol de 2026 a una dosi de 0.25 l/ha (volum brou 2500-3000 l/ha) i màxim dos aplicacions.

OLIVERA

Mosca de l'oliva (*Bactrocera oleae*)

Durant aquest mes, són molt freqüents forts increments de poblacions, que coincideixen amb els períodes de susceptibilitat de moltes varietats d'oliva. Atès que els atacs de mosca són molt irregulars, és important tenir en compte que els pagesos han de seguir fent recomptes d'olives picades. El risc d'atac serà més elevat amb temperatures suaus i humitats elevades.

Mesures culturals

Cal conèixer el grau de sensibilitat de les diferents varietats d'oliva a la picada de la mosca, regular el reg durant l'estiu per controlar el creixement de l'oliva, fer una poda adequada, evitar l'excés d'adob nitrogenat per aconseguir copes airejades, i establir i/o mantenir tanques verdes per afavorir la presència i l'actuació d'enemics naturals autòctons de la mosca.

Control biològic

En el marc de l'ajut a sistemes alternatius a la lluita química contra la mosca de l'oliva, s'ha d'instal·lar en el camp la captura massiva o l'atracció i mort abans que apareguin les primeres poblacions de la plaga. L'objectiu d'aquestes tècniques és reduir el nivell de les poblacions d'adults. Un dels requisits per acollir-se a aquest ajut és ser soci d'una ADV.

Tractament fitosanitari

Només caldrà en el cas que se sobrepassi el 5% de picada nova i tenint molt presents les condicions d'ús dels productes escollits. Per això, és important estar molt atents a les recomanacions de les diferents estacions d'avisos i sobretot a les recomanacions específiques de les ADV de cada zona.

Els enllaços següents contenen més informació sobre les mesures de prevenció i lluita contra la mosca de l'oliva:

[Full informatiu lluita contra la mosca](#)

[Mesures preventives](#)

Ull de gall o repilo (*Cycloconium oleaginum*)

Si es donen les condicions favorables, pluges i temperatures suaus, es pot desenvolupar el fong *C. Oleaginum*, que ocasiona fortes defoliacions en l'olivera.

Mesures culturals

Cal fer podes que permetin l'aeració de l'interior de l'arbre i que d'aquesta manera les fulles banyades s'assequin al més aviat possible, i cal no excedir-se amb l'adob nitrogenat. En noves plantacions cal utilitzar varietats resistents i, si és possible, cal disposar les fileres de manera que es redueixi la quantitat d'hores d'ombra entre els arbres.

Tractament fitosanitari

Cal aplicar el tractament si es veuen taques a les fulles, i repetir-lo periòdicament amb fungicides cúprics i compostos orgànics si es continuen veient símptomes. Si plou més de 15-20 litres per metre quadrat, s'ha de repetir el tractament, ja que el fungicida s'haurà rentat.

Sabonosa (*Colletotrichum* spp.)

Durant el canvi de coloració i maduració de les olives, les humitats altes i les temperatures suaus poden provocar-hi infeccions de sabonosa. La sabonosa fa pujar molt l'acidesa de l'oli, i provoca que s'assequin les branques afectades, cosa que impedeix que hi hagi collita la campanya següent.

Mesures culturals

Cal fer la recol·lecció al més aviat possible en la totalitat de l'arbre; a més, en parcel·les afectades, és important enretirar els fruits afectats del terra o directament tallar les branques

amb molts fruits momificats. En noves plantacions, cal utilitzar varietats resistents i evitar així altes densitats de plantació.

Tractament fitosanitari

El moment adequat per aplicar el tractament és abans o durant el canvi de color. És recomanable repetir el tractament al cap de 15 dies.

VINYA

Flavescència daurada

Cal extremar la vigilància dels ceps, principalment a les comarques del Gironès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà, ja que aquesta és una malaltia molt greu que provoca la mort dels ceps.

L'Ordre ACC/231/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'estableixen mesures obligatòries per a la prevenció i lluita de la flavescència daurada de la vinya (DOGC núm. 9026, de 24.10.2023), especifica a l'article 3 les obligacions següents:

“Els operadors professionals de material vegetal de plantació de *Vitis* L., les persones titulars d'explotacions agrícoles i les persones professionals del sector de la vinya han de vigilar la presència de la flavescència daurada de la vinya a les seves plantacions i vivers, i han de comunicar a la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels serveis territorials del departament competent en matèria d'agricultura i sanitat vegetal corresponent, la detecció de vinyes o altres plantes hostes afectades o amb símptomes sospitosos de flavescència daurada de la vinya.”

Símptomes sospitosos: canvi de coloració prematura de les fulles (grogua en les varietats blanca i vermella en les varietats negres); caragolament de fulles cap a l'interior; assecament del raïm; sarments amb port desmaiats i sense lignificar.

A finals d'estiu és quan se'n manifesten més clarament els símptomes.



Varietats negres



Varietats blanques

PRODUCTES FITOSANITARIS. AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS

Per comprovar si un producte fitosanitari està autoritzat per a un cultiu determinat, cal fer la consulta al web del [Registre de productes fitosanitaris, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació \(MAPA\)](#).



A continuació es detallen els productes autoritzats de manera excepcional per a un període concret, segons l'article 53 del Reglament (CE) 1107/2009, fins a la data de la publicació d'aquest avís. També es pot consultar l'estat de les autoritzacions excepcionals de les matèries actives a l'apartat "Altres autoritzacions de productes fitosanitaris" de la [pàgina web del MAPA](#).

AUTORIZACIONS EXCEPCIONALS 2026								
Matèria activa	Utilitat	Cultiu	Dosis	Aplicacions màximes	Termini de seguretat (dies)	Inici del període d'utilització	Final del període d'utilització	Observacions
Piretrines + Feromones	<i>Delottococcus aberiae</i> , <i>Aonidiella aurantii</i> i <i>Planococcus citri</i>	Cítrics	Piretrines 5% RB P/P: 400-600 trampes/ha. BBCH: 00-89 Piretrines 8% RB P/P (170 mg/trampa): 450 trampes/ha. BBCH: 01-59		NP	21/09/2026	30/09/2026	
1-metilciclopropè 17,15 g/l [SC]	Tractament contra <i>Prays oleae</i> mitjançant confusió sexual	Pomera	8,75-11,7 L/ha	1	3	01/07/2026	28/10/2026	Regulador del creixement, retarda la maduració del fruit a l'arbre, abans de la collita.
		Perera				15/06/2026	12/10/2026	
(Z,Z)-3,13-octadecadienil acetat 808 g/kg (E,Z)-3,13-octadecadienil acetat 43 g/kg	Insecticida contra <i>Synanthedon myopaeformis</i>	Fruita de llavor	500 dispositius/ha	1	NP	09/06/2026	17/09/2026	1 Aplicació abans del primer vol de l'insecte objecte

Podeu trobar informació més concreta a les diferents estacions d'avís:

<http://www.ruralcat.net/web/guest/avisos.fitosanitaris>

PER A MÉS INFORMACIÓ: <http://agricultura.gencat.cat/sanitatvegetal>

Servei de Sanitat Vegetal		
Laboratori de Sanitat Vegetal	973 305 477	
Serveis Centrals	933 046 700	sanitatvegetal.agricultura@gencat.cat
Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran	973 355 275	st_altpirineuiaran.agricultura@gencat.cat
Serveis Territorials a Barcelona	934 092 090	agricultura.stbcn.agricultura@gencat.cat
Serveis Territorials a la Catalunya Central	938 828 790	agricultura.stcen.agricultura@gencat.cat
Serveis Territorials a Girona	972 454 310	agricultura.stgir.agricultura@gencat.cat

Serveis Territorials a Lleida	973 236 412	agricultura.stlle.agricultura@gencat.cat
Serveis Territorials al Penedès	938 170 534	st_penedes.agricultura@gencat.cat
Serveis Territorials a Tarragona	977 250 421	agricultura.sttgn.agricultura@gencat.cat
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre	977 500 174	agricultura.stebr.agricultura@gencat.cat
Servei de Gestió Forestal	935 674 200	sanitatforestal.agricultura@gencat.cat