

REUNIÓ TAULA SECTORIAL AGRÀRIA FLOR I PLANTA

4 de març del 2026
Seu dels serveis centrals del DARPA
Barcelona



ORDRE DEL DIA



Taula Sectorial Agrària de la Flor i Planta. 04/03/2026

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
2. Situació del sector: inquietuds, necessitats, ...
3. Situació fitosanitària (*Xylella*)
4. Torn obert de paraula.

2

SITUACIÓ DEL SECTOR: INQUIETUDS, NECESSITATS ...

2. Situació del sector: inquietuds, necessitats, ...

- Mercat de la Flor i Planta:

- ☐ Llei de la cadena alimentària.
- ☐ Mercosur.
- ☐ Mesures per a futures sequeres.
- ☐ Ajut lluita integrada.

- FCAC:

- ☐ Assegurances i pòlisses en infraestructures al sector viverista.

3

SITUACIÓ FITOSANITÀRIA (*Xylella*,)



Situació Fitosanitària

Taula sectorial Flor i Planta

4 de març de 2026



Situació fitosanitària

- *Xylella fastidiosa*
- *Acutaspis paulista*
- Exercici de Simulació de *Popillia japonica*

7

Xylella fastidiosa

- Bacteri que obstrueix el flux de saba
- Ataca múltiples espècies llenyoses
- **No detectat a Catalunya**
- Plaga de quarantena prioritària a la UE
- Transmissió:
 - Material vegetal infectat
 - Insectes vectors:
 - *Phylaenus spumarius*
 - *Neophylaenus* sp
 - *Draeculacephala robinsoni* ?
 - Altres cicadel·les ?
- Subespècies de *Xylella fastidiosa*: *Pauca*, *Multiplex*, *Fastidiosa*




8

Xylella fastidiosa

Seguim sense detectar la seva presència a Catalunya

- Anàlisis de plantes pel Laboratori de Sanitat Animal i Vegetal de Catalunya.
 - 1098 mostres => Totes negatives
- Seguiment insectes vectors (IRTA). Analítiques vectors negatives
- **Prospeccions de camp:**
 - Vinya
 - Olivera
 - *Prunus spp*
 - Cítrics
- **Prospecció en viviers:** espècies especificades alt risc.



9

Xylella fastidiosa

Prospeccions amb presa de mostra 2026 segons els àmbits:

Tabla 6. Número de muestras por Comunidad Autónoma en las 4 unidades epidemiológicas

CCAA	Agrícola	Forestal	Urbano	Otros lugares de riesgo	TOTAL
ANDALUCÍA	150	150	150	150	600
ARAGÓN	50	41	32	57	180
CANTABRIA	0	10	7	8	25
CASTILLA Y LEÓN	74	74	74	74	296
CASTILLA-LA MANCHA	71	65	7	67	210
CATALUÑA	74	74	74	74	296
COMUNIDAD DE MADRID	3	9	67	7	86
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	8	24	35	12	79
COMUNIDAD VALENCIANA	74	74	74	74	296
EXTREMADURA	74	74	74	74	296
GALICIA	49	37	30	43	159
LA RIOJA	17	10	8	6	41
PAÍS VASCO	27	10	26	10	73
PRINCIPADO DE ASTURIAS	0	19	13	15	47
REGIÓN DE MURCIA	74	74	74	74	296
TOTAL ESPAÑA	745	745	745	745	2980

10


Xylella fastidiosa

Prospeccions amb presa de mostra 2026 en viviers:

CA	Zonas de Riesgo	Especies	Nº TOTAL de viveros	Nº DE AGRUPACIONES de viveros con mismas especies y presentes en zonas homogéneas	Nº DE PLANTAS PRODUCIDAS/ESPECIE	Reparto de las 292 muestras (aplicando el 80-1 a cada agrupación) 1/sp
Cataluña	-	Coffea arabica	3	1	297	1
		Lavandula angustifolia	41		542.055	1
		Lavandula dentata	34		388.505	1
		Lavandula x intermedia	4		44.292	1
		Lavandula latifolia	2		5.300	1
		Lavandula stoechas	13		185.410	1
		Nerium oleander	37		154.661	1
		Olea europaea	103		107.434.504	280
		Polygala myrtifolia	1		26	1
		Prunus dulcis	33		30.032	1
		Salvia rosmarinus	32		1.099.909	3


Xylella fastidiosa

Situació actual a Europa 2024



Xylella fastidiosa


Situació actual a Europa 2025



13

Xylella fastidiosa

Illes Balears



Detecció: 2016

- 24.075 mostres (1.986 positives)
- Formentera continua lliure de *Xylella*
- 38 espècies vegetals afectades
- Última notificació 16 de juliol 2024.




14

Xylella fastidiosa

País Valencià

- **Detecció: 2017**
- Subespècie: **múltiplex ST6**
- 29 espècies afectades, el 90% ametller
 - *Prunus cerasifera*
 - *Prunus spinosa*
 - *Cercis siliquastrum*
- Zona Demarcada: 165.000 ha
- Últim municipi Alcoi
- **77 vivers i centres jardineria amb restriccions de moviment.**



15

Xylella fastidiosa


Extremadura

VALCAN	Muestras	Positivos	Especies	Zona infectada	Zona demarcada
Inicial	112	5	4	3,93	1.365,9
Diciembre 2024	406	60	9	40,59	3.889,08
TOTAL	518	65	10	44,52 ha	5.254,98 ha

Xylella fastidiosa subespecie fastidiosa ST 1

MLST de 26 muestras sobre 10 especies vegetales distintas: *Cistus ladanifer*, *Cytisus scoparius*, *Cytisus sp.*, *Cytisus villosus*, *Ficus carica*, *Genista tridentata*, *Lavandula sp.*, *Lavandula stoechas*, *Spartium junceum* y *Ulex sp.*,

- **A finals del 2024 l'han detectat en una vinya aïllada**



16

Xylella fastidiosa

Portugal

- Detecció: 2019
- Un dels brots el passaran a contenció (blau)
- Aixecament de la ZD Tavira (Algarve)
- Detecció de *Philaenus tessellatus* (forestal)
- Detecció de sbsp *fastidiosa* ST1 en Olivera




17

Xylella fastidiosa

Occitània

- Detecció: 2020
- La subespècie identificada a Occitània és la subespècie *Xylella fastidiosa* subsp. *Multiplex*
- Focus prop Perpinyà
- Afecta a:
 - ✓ *Spartium junceum*,
 - ✓ *Prunus dulcis*,
 - ✓ *Lavanda* ...



18


Situació *Acutaspis paulista*

Caparreta gris circular de l'olivera



Acutaspis paulista

Distribució actual a Catalunya



Acutaspis paulista

Distribució actual a Catalunya

MUNICIPI PROSPECTATS	PARCEL·LES PROSPECTADES	% PARCEL·LES INFECTADES	NIVELL DE INCIDÈNCIA EN LES PARCEL·LES PROSPECTADES			
			nul (0%)	baix (1% al 15%)	mig (16% al 60%)	alt (>60%)
ALBONS	4	25,00	3	1	0	0
BELLCAIRE D'EMPORDA	4	75,00	1	1	1	1
BISBAL D'EMPORDA (LA)	2	0,00	2	0	0	0
CORÇA	6	50,00	3	3	0	0
FONTANILLES	5	0,00	5	0	0	0
FORALLAC	12	8,33	11	0	1	0
PALAU-SATOR	6	0,00	6	0	0	0
PALS	5	0,00	5	0	0	0
PARLAVA	2	50,00	1	1	0	0
RUPIA	2	0,00	2	0	0	0
TALLADA D'EMPORDA (LA)	11	45,45	6	0	0	5
TORROELLA DE MONTGRI	57	29,82	40	11	1	5
ULLÀ	33	90,91	3	14	8	8
ULLASTRET	15	20,00	12	2	1	0
ULTRAMORT	4	50,00	2	2	0	0
VERGES	3	66,67	1	0	0	2

21

Acutaspis paulista

Full informatiu

Web Servei de
Sanitat vegetal

Acutaspis paulista (Caparreta grisa circular de l'olivera)



Afectació de la caparreta en fulles i fruit, a l'esquerra de la imatge i ninfa adult femella a la dreta Font: Departament

S'ha detectat per primera vegada a Europa, en una plantació d'olivera (*Olea europaea*) i en dues espècies ornamentals (*Euonymus japonicus* i *Ligustrum spp.*) a la comarca del Baix Empordà (Girona).

Comunicar els símptomes és molt important per diagnosticar a temps la plaga i prendre mesures. En cas de detecció avisar al Servei de Sanitat Vegetal.

Insecte diaspinid.

Full informatiu

★ [Acutaspis paulista \(caparreta grisa circular de l'olivera\)](#) [471,75 kB]

22



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN A USOS SECUNDARIOS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS A BASE DE PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V

ANTECEDENTES

1.- La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya ha propuesto la ampliación de la autorización de la formulación de los productos fitosanitarios a base de PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V al uso olivo para el control de cochinilla gris circular del olivo, *Acutaspis paulista* (dentro de la familia Píojos, *Diaspididae*).

2.- Los productos fitosanitarios formulados a base de PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V se encuentran autorizados en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario para tratamientos en olivo, contra caparreta negra, *Saissetia oleae*. El uso propuesto se considera de interés local y público.

Por todo lo expuesto, **RESUELVO**:

Autorizar la ampliación de uso para los productos fitosanitarios cuya formulación es PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V al uso olivo para el control de cochinilla gris circular del olivo, *Acutaspis paulista* (dentro de la familia Píojos, *Diaspididae*), en las mismas condiciones de uso establecidas para olivo contra caparreta negra, *Saissetia oleae*.

23

Acutaspis paulista

Full informatiu

Web Servei de
Sanitat vegetal

Nova caparreta en olivera

Acutaspis paulista - Caparreta grisa circular de Tòlivera

Novembre
2025

Introducció

S'ha detectat per primera vegada a Europa la presència de l'insecte *Acutaspis paulista* (Homoptera: Diaspididae) en una plantació d'olivera (*Olea europaea*) i en dues espècies ornamentals (*Eucalyptus japonicus* i *Ligustrum* spp.) a la comarca del Baix Empordà (Girona).

Acutaspis paulista és un diaspíid d'origen sud-americà molt present a Brasil i Argentina, declarada com a plaga de quarantena a Xile.

És una plaga que ha mostrat un gran potencial invasor, és molt polífaga i afecta a espècies benigne, tant cultivades com ornamentals i forestals. Els hosts deserts en el país d'origen són: *Annona muricata*, *Aspidosperma quebracho-blanco*, *Begonia* spp., *Burkholderia australis*, *Buxus sempervirens*, *Camellia japonica*, *Cestola* spp., *Citrus* spp., *Eucalyptus microcorys*, *Eucalyptus* spp., *Ficus* spp., *Hedera helix*, *Laurus nobilis*, *Licania tomentosa*, *Ligustrum* spp., *Mangifera indica*, *Maytenus boaria*, *Maytenus viscidifolia*, *Musa* spp., *Myrsina* spp., *Nerium oleander*, *Olea europaea*, *Persea americana*, *Pittosporum* spp., *Phoradendron* spp., *Populus* spp., *Psidium* spp., *Quercus xalapensis*, *Rosa* spp., *Scondes* spp.

Descripció i biologia

Passa l'hivern com a femella fecundada. Pot completar entre 3 i 4 generacions anuals en les condicions climàtiques dels països afectats. Les formes adultes es recol·leen d'un escut i s'adhereixen fortament al substrat (fulla, rija o fruit), sovint damunt de les olives.


Morfologia

Ou: color groc ataronjat.

Niua: en els primers estats són grogues i després evolucionen a violàcies.

Adult:

- Femella: l'escut de les femelles és rodó, de 2-3 mm de diàmetre. Color bru, cobert per una pel·lícula blanca tènue que dona una coloració grisenca, amb esbossos apicals de color negre intens. El cos és rodó i de color ambri.
- Masclle: l'escut és ovalat, d'1,5-2 mm de diàmetre per la part llarga. Color castany fosc que evolucionarà cap a gris per les caròtids que cobreixen l'escut.



1. Adult mascle
2. Adult femella, Niua
3. Escut amb vermell

3

Generalitat
de Catalunya

24

Acutaspis paulista

Full informatiu

Web Servei de Sanitat vegetal

Nova caparreta en olivera

Síntomes i danys

S'observen petits escuts arrodonits, marrons-grisos amb un punt negre apical. S'adhereixen a fulles, tiges o fruits. La succió que realitzen de la saba causa un dany directe que debilita fulles i branques, i genera un debilitament general de la planta. La presència dels escudets pot arribar a cobrir totalment les fulles, les tiges i els fruits reduint la seva capacitat fotosintètica i causant una pèrdua de vigor. El recolliment reduïx la qualitat dels fruits. En els països on s'ha detectat ha generat un impacte econòmic important per la depreciació comercial dels fruits i el debilitament de la planta.



4. Afectació en fulla d'olivera
5. Afectació en una oliva

Mitjans de lluita

En la situació actual és molt important el monitoratge i la comunicació de qualsevol sospita. Es recomana que, en cas de dubte, en contacti amb l'autoritat competent i, sobretot, es compleixin totes les recomanacions del Servei de Sanitat Vegetal de Catalunya (via els avisos fitosanitaris) o les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) del territori.

Monitoratge

- Vigilar durant tot l'any, encara que el període òptim es durant la primavera i l'estiu, quan la plaga és més activa.
 - Prospecció de fulles, branques i fruits amb lupa, aixecant alguns escuts per comprovar si hi ha estadis vius (arves o femelles actives).
- ##### Medures de control
- Retirar i destruir les parts vegetals afectades.
 - Netejar la maquinària quan aquesta canvia de finca.
 - Transportar les olives sense fulles ni brots.
 - Portar les olives tapades durant els trajectes, per evitar la dispersió de la plaga.
 - Aplicar productes autoritzats pel Registre oficial de productes fitosanitaris del MAPA, per l'organisme i cultiu concret i complir les condicions d'utilització que figuren al registre.
 - Alternar les matèries actives per prevenir l'aparició de resistències.

Comunicar al Servei de Sanitat Vegetal qualsevol sospita de la plaga

Servei Territorial Alt Pirineu i Aran	973 355 275	si_alpin@seu.arsan-agricultura@gencat.cat
Servei Territorial a Barcelona	934 092 090	agricultura.stbcn-agricultura@gencat.cat
Servei Territorial a la Catalunya Central	938 828 790	agricultura.stccn-agricultura@gencat.cat
Servei Territorial a Girona	972 454 310	agricultura.stgr-agricultura@gencat.cat
Servei Territorial a Lleida	973 236 412	agricultura.stlle-agricultura@gencat.cat
Servei Territorial del Prebosc	938 170 534	si_prebosc-agricultura@gencat.cat
Servei Territorial a Tarragona	977 250 421	agricultura.sttgr-agricultura@gencat.cat
Servei Territorial a les Terres de l'Ebre	977 500 174	agricultura.stebr-agricultura@gencat.cat

© Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
© Institut de Sanitat Vegetal, Josep M. Ferrer



Popillia japonica





Generalitat de Catalunya

27

4

TORN OBERT DE PARAULA



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gabinet Tècnic

Taules Sectorials Agràries